

# Soppbehandling

Soppinfeksjoner på Hudlegekontoret behandles på følgende måte med systemisk antimykotisk behandling. I tillegg til eventuell lokalbehandling med kremer.

Av Dr. Helge Bengtsson

Type sopp	Lokalisasjon	Preparat	Behandlingstid
Dermatofytter (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton)	Utbredt over større hudområder	Lamisil	28 dager
Dermatofytter (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton)	I håndflater og fotsåler	Lamisil	28 dager
Dermatofytter (Trichophyton)	I hodebunn og hår	Lamisil	2 - 6 uker
Dermatofytter (Microsporum)	I hodebunn og hår	Fulcin eller Diflucan	2 - 4 måneder
Seborroisk inflammasjon (Pityrosporum ovale))	I hodebunn	Fungoral	I 10 dager. Deretter første, andre og tredje dag i hver måned.
Dermatofytter (Trichophyton, Epidermophyton)	I negler	Lamisil	98 - 196 dager
Scopulariopsis brevicaulis	I negler	Diflucan eller Lamisil	1 år
Pityrosporum ovale (Pityriasis versicolor - Malassezia furfur)	På hud	Diflucan eller Lamisil	10 dager
Candida	I munnhulen, vagina og vulva	Diflucan	1 - 3 dager
Candida	På hud, i lysker, crura og føtter (under salvestrømpe)	Diflucan eller Fungoral	1 - 3 dager
Candida	I negleroten	Diflucan	3 måneder
Candida	I negler	Diflucan	1 år