

Brenning og skrapping av hudtumores (EI og curretage)

Etter curettage-electrodesiccation (skrapping/brenning) av hudtumorer kan det de første dagene forekomme en liten hevelse. Spesielt utsatt er øyenpartiet etter behandling i øverste del av ansiktet.

Av Dr. Helge Bengtsson

Såret gror best uten kompress og plaster og trenger ingen medisinsk behandling.

Mot slutten av den første uken kan en pusslignende, iblant blodfarget væske komme fram under kanten av sårskorpen. Dette er et normalt tegn på at skorpen begynner å løsne (ikke symptom på infeksjon).

De 2 første ukene kan det blø fra såret. Trykk da en kompress mot såret til det slutter å blø. Inntørket sårvæske kan vaskes forsiktig bort med vann og såpe. Under den andre eller tredje uken kan man fjerne sårskorpen forsiktig.

Etter at såret har grodd kan arret være rødt og kjennes tykt. Dette er ikke tegn på at det er mer tumor igjen. Med tiden blir som regel arret blekt, tynt og mykt. For at arret skal bli minst mulig er det en fordel å beskytte arrområdet mot sollys med plaster eller solblokkerende kremer.

Normalt blir det ikke arr, men på brystbenet, haken, skuldre og håndrygg kan det forekomme.